

Mehr Ertrag durch Forschung und Innovation



Indikationsübersicht Gemüsebau 2024



/// Indikationsübersicht Freiland

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Ackerbohne	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Blattrandkäfer, Erbsengallmücke	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden von Befallssymptomen, BBCH 11–79
Anis (zur Samen- nutzung)	Bandur	1	3 l/ha	k.A.	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur oder nach dem Auflaufen der Kultur, Frühjahr; ab dem 3. gefiederten Blatt bis max. Ende des Rosettenstadiums
Anis (zur Samen- nutzung)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Dolden- erkrankungen	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, bis BBCH 65
Blattgemüse	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit	J	F	BBCH 13–49
Blattkohl	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit	J	F	BBCH 12–49
Blattkohl	Flint	1	0,4 kg/ha	14	2758	Echter Mehltau, pilzliche Blatt- fleckenkrankheiten	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, BBCH 16–45
Blattkohl	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Grauschimmel, Weißstängeligkeit (nur bedingt wirksam)	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 12–49
Bohnen (mit Hülsen)	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit	J	F	BBCH 12–79
Brokkoli	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl- mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Brokkoli	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	BBCH 12–49
Buschbohne	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	J	F	Vorauflauf, bis 5 Tage nach der Saat, bis BBCH 11 der Ungräser
Buschbohne	Luna Sensation	2	0,8 l/ha	7	3603	Bohnenrost, Sclerotinia sclerotiorum	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, BBCH 59–69
Buschbohne	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	0	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 21–29
Buschbohne (mit Hülsen)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	7	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 51–87
Buschbohne (mit Hülsen)	Teldor WG	2	1,5 kg/ha	3	3690	Grauschimmel	J	F	Bei Infektionsgefahr, BBCH 60–69
Buschbohne (ohne Hülsen)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	3	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 51–87
Chinakohl	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl- mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Chinakohl	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	BBCH 12–49
Dille	Bandur	1	3,5 l/ha auf schweren Böden; 3 l/ha auf leichten oder mittleren Böden	k.A.	2579	Einjährige zwei- keimblättrige Unkräuter, Acker- fuchsschwanzgras, Gemeiner Windhalm, Einjährige Rispe	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Dille (zur Samennutzung)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Dolden- erkrankungen	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, bis BBCH 65
Echte Spargelerbse (mit Hülsen)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	7	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 30–87
Endivie	Cadou SC	1	0,48 l/ha	32	3941	Einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	J	F	Bis 7 Tage nach dem Pflanzen, bis BBCH 19, bis BBCH 11 der Ungräser
Endivie	Luna Sensation	1	0,8	7	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis; BBCH 13–19
Endivie	Teldor WG	2	1,5 kg/ha	3	3690	Grauschimmel	J	F	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 13
Erbse frisch	Decis Forte	2	0,0625 l/ha	7	3554	Blattrandkäfer, Erbsengallmücke, Erbsenwickler	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden von Befallssymptomen, BBCH 11–79
Erbse (Gemüseerbse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	0	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 12–19
Erbse (Gemüseerbse) (ohne Hülsen)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	3	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 30–87
Erbse (Gemüseerbse) (mit Hülsen)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	7	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 30–87
Fenchel	Bandur	1	3,5 l/ha auf schweren Böden; 3 l/ha auf leichten oder mittleren Böden	k.A.	2579	Einjährige zwei- keim- blättrige Unkräuter, Ackerfuchsschwanz- gras, Gemeiner Windhalm, Einjährige Rispe	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Fenchel (zur Samennutzung)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Dolden- erkrankungen	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, bis BBCH 65
Feuerbohne	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	J	F	Vorauflauf, bis 5 Tage nach der Saat, bis BBCH 11 der Ungräser
Feuerbohne (ohne Hülsen)	Luna Sensation	2	0,8	14	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis; BBCH 55–80
Flaschenkürbis (mit genießbarer Schale)	Cupravit	4	3 l/ha	3	3405-901	Pilzliche Blattflecken- erreger (zur Befalls- minderung); Falscher Mehltau (zur Befallsminderung)	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, ab BBCH 15
Fruchtgemüse	Serenade ASO	9	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis, Echter Mehltau	J	F	BBCH 12–89
Garten-Kürbis (mit genießbarer Schale)	Cupravit	4	3 l/ha	3	3405-901	Pilzliche Blattflecken- erreger (zur Befalls- minderung); Falscher Mehltau (zur Befallsminderung)	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, ab BBCH 15
Gemeine Ringelblume (Nutzung als Arzneipflanze)	Bandur	1	3 l/ha	k.A.	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Gemüseerbbsen	Bandur	1	4 l/ha	k.A.	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Gemüse- kulturen	Roundup Powerflex	1	1,67 l/ha	k.A.	3437	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	N	F	Nach der Ernte; bis 2 Tage vor der Saat
Gemüsesoja	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	0	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 21–29
Gemüsesoja (ohne Hülsen)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	3	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 51–87

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Gemüsesoja (mit Hülse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	7	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 51–87
Ginkgo (für pharmazeutische Zwecke)	Bandur	2	3 l/ha	k.A.	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	1. Anwendung: vor dem Austrieb; 2. Anwendung: nach dem Austrieb, Frühsommer
Grünkohl	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl- mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Grünkohl	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	BBCH 12–49
Gurke	Cadou SC	1	0,5 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen oder vor dem Pflanzen, bis BBCH 11 der Ungräser
Gurke	Cupravit	4	3,1 l/ha	3	3405-901	Falscher Mehltau	N	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn- diensthinweis, BBCH 13–79
Gurke	Flint	1	0,5 kg/ha	3	2758	Echter Mehltau, Stängelbrand	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome
Gurke	Previcur Energy	2	2,5 l/ha	3	3109	Falscher Mehltau	N	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Hülsenfrüchte (getrocknet)	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit	J	F	BBCH 12–89
Karfiol (Blumenkohl)	Decis Forte	3	0,075 l/ha	7	3554	Erdflöhe, Raupen	N	F	BBCH 10–49
Karfiol (Blumenkohl)	Folicur	2	1 l/ha	21	2670	Alternaria-Arten	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome, ab BBCH 13
Karfiol (Blumenkohl)	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl- mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Karfiol (Blumenkohl)	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	BBCH 12–49
Karfiol (Blumenkohl)	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Grauschimmel, Weißstängeligkeit (nur bedingt wirksam)	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 12–49
Karotte	Bandur	1	4 l/ha	80	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Karotte	Bandur	2	1. Applikation: 1,5 l/ha 2. Applikation: 1 l/ha	90	2579	Ackerfuchsschwanz, Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, Einjährige Rispe	J	F	1. Applikation: vor dem Auflaufen 2. Applikation: BBCH 13
Karotte	Bandur	3	1. Applikation: 1 l/ha 2. Applikation: 0,75 l/ha 3. Applikation 0,75 l/ha	60	2579	Ackerfuchsschwanz, Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, Einjährige Rispe	J	F	1. Applikation: Vor dem Auflaufen 2. Applikation: BBCH 10 3. Applikation: Stadium 12
Karotte	Cupravit	6	2 l/ha	14	3405-901	Möhrenschwärze (Alternaria dauci)	N	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn- diensthinweis, BBCH 13–47
Karotte	Decis Forte	2	0,125 l/ha	7	3554	Karottenfliege, Blatt- läuse, Schmetter- lingsraupen, Thripse	J	F	BBCH 11–49, 1. Laubblatt entfaltet – Dickenwachstum abgeschlossen; art-/sortentypische Form und Größe der Rübe, Wurzel bzw. Knolle er- reicht
Karotte	Flint	2	0,4 kg/ha	21	2758	Echter Mehltau, Möhrenschwärze	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome, ab BBCH 10
Karotte	Flint Max	2	0,3 kg/ha	21	2980	Echter Mehltau, Möhrenschwärze, Sclerotinia-Arten	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome
Karotte	Folicur	3	1 l/ha	21	2670	Möhrenschwärze	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome, ab BBCH 13

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Karotte	Luna Sensation	2	0,5 l/ha	14	3603	Echter Mehltau, Möhrenschwärze, Sklerotinia	J	F	BBCH 41–49
Karotte	Luna Veggie	2	0,75 l/ha	14	3655	Möhrenschwärze, Echter Mehltau	N	F	Bei Infektionsgefahr, BBCH 41–49
Karotte	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	21	3021	Karotten-Wurzellaus	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sicht- barwerden der ersten Symptome, BBCH 12–49
Karotte	Movento 100 SC	2	0,45 l/ha	21	3021	Blattläuse	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sicht- barwerden der ersten Symptome, BBCH 12–49
Karotte	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	21	2963	Karotten-Wurzellaus	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sicht- barwerden der ersten Symptome, BBCH 12–49
Karotte	Movento 150 OD	2	0,3 l/ha	21	2963	Giersch-Blattlaus	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sicht- barwerden der ersten Symptome, BBCH 12–49
Karotte	Sencor Liquid	1	0,3 l/ha	42	3381	Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, ausgenommen Klettenlabkraut	J	F	Nach dem Auflaufen, BBCH 13–14
Karotte	Sencor Liquid	2	1. Anwendung: 0,1 l/ha; 2. Anwendung: 0,2 l/ha	42	3381	Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, ausgenommen Klettenlabkraut	J	F	Nach dem Auflaufen, BBCH 12–15
Karotte	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Echter Mehltau (Befallsminderung), Möhrenschwärze (Befallsminderung)	N	F	BBCH 41–49
Kichererbse	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	0	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 12–19
Kichererbse	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	7	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 30–87
Knoblauch	Bandur	2	0,5 l/ha	49	2579	Wolfsmilch-Arten	J	F	Nach dem Auflaufen, BBCH 12–14 der Kultur
Knoblauch	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	J	F	Voraufbau, bis BBCH 11 der Ungräser
Knoblauch	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Lauchmotte, Blatt- läuse, Minierfliege, Thripse	J	F	BBCH 11–49, 1. Laubblatt deutlich sichtbar – Zwiebellaub abgestorben, physiologische Ruhe
Knoblauch	Luna Veggie	2	0,5 l/ha	7	3655	Purpurflecken- krankheit, Rost	J	F	Bei Infektionsgefahr, BBCH 41–49
Knoblauch	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha	7	2963	Zwiebelthrips	N	F	BBCH 13–47
Knoblauch (Nutzung als Trockenzwiebel)	Cupravit	6	2 l/ha	3	3405-901	Falscher Mehltau	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn- diensthinweis, ab BBCH 13
Knollensellerie	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	J	F	Bis 6 Tage nach dem Pflanzen, bis BBCH 19, bis BBCH 11 der Ungräser
Knollensellerie	Bandur	1	1 l/ha	90	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Nach dem Pflanzen
Knollensellerie	Cupravit	6	2 l/ha	14	3405-901	Blattfleckenkrankheit (zur Befallsminderung)	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn- diensthinweis, ab BBCH 41
Knollensellerie	Decis Forte	1	0,075 l/ha	30	3554	Erdflöhe	J	F	BBCH 11–49
Knollensellerie	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	21	3021	Karotten-Wurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Knollensellerie	Movento 100 SC	2	0,45 l/ha	21	3021	Blattläuse	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Knollensellerie	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	21	2963	Karotten-Wurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Knollensellerie	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	F	BBCH 12–49
Knollensellerie/ Pastinaken	Luna Sensation	2	0,5 l/ha	14	3603	Echter Mehltau, Möhrenschränke, Sklerotinia	J	F	BBCH 41–49
Kohl	Cupravit	4	2 l/ha	7	3405-901	Kohlschwärze	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Kohlrabi	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl-mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Kohlrabi	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	Dickenwachstum abgeschlossen, art-/sortentypische Form und Größe der Knolle erreicht; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Kohlrabi	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Kohlrübe	Decis Forte	1	0,075 l/ha	30	3554	Erdflöhe	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 11–49
Kohlsprossen	Cupravit	4	2 l/ha	7	3405-901	Kohlschwärze	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Kohlsprossen	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Erdflöhe, Raupen	N	F	BBCH 10–49
Kohlsprossen	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl-mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Kohlsprossen	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Kopfkohl	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Erdflöhe, Raupen	N	F	BBCH 10–49
Kopfkohl	Folicur	3	1 l/ha	21	2670	Kohlschwärze	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, ab BBCH 13
Kopfkohle	Flint	2	0,4 kg/ha	14	2758	Kohlschwärze, Mycosphaerella brassicicola	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Kopfkohle	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Grauschimmel, Weißstängeligkeit (nur bedingt wirksam)	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, BBCH 12–49
Koriander (zur Samen-nutzung)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Dolden-erkrankungen	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, bis BBCH 65
Koriander (zur Samen-nutzung)	Bandur	1	3,5 l/ha auf schweren Böden; 3 l/ha auf leichten oder mittleren Böden	k.A.	2579	Einjährige zweikeim-blättrige Unkräuter, Ackerfuch-schwanzgras, Gemeiner Wind-halm, Einjährige Rispe	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Kräuter (frisch)	Teldor WG	2	1,5 kg/ha	7	3690	Grauschimmel	J	F	Bei Infektionsgefahr
Kren	Cupravit	6	2 l/ha	14	3405-901	Falscher Mehltau, Weißer Rost	J	F	BBCH 13-47
Kren	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	F	BBCH 12–49
Kümmel (zur Blattnutzung)	Luna Sensation	1	0,5 l/ha	14	3603	Echter Mehltau, Möhrenschränke, Sklerotinia	J	F	BBCH 41–49

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Kümmel (zur Samennutzung)	Bandur	1	3,5 l/ha auf schweren Böden; 3 l/ha auf leichten oder mittleren Böden	k.A.	2579	Einjährige zweikeim-blättrige Unkräuter, Ackerfuch-schwanzgras, Gemeiner Wind-halm, Einjährige Rispe	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Kümmel (zur Samennutzung)	Bandur	1	3 l/ha	k.A.	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Nach dem Auflaufen der Kultur; Herbst, ab dem 3. gefiederten Blatt bis Vegetationsende oder Frühjahr, Vegetationsbeginn bis max. Ende des Rosettenstadiums
Kümmel (zur Samennutzung)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Dolden-erkrankungen	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, bis BBCH 65
Kürbis-Hybriden	Cadou SC	1	0,5 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim-blättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen oder vor dem Pflanzen, bis BBCH 11 der Ungräser
Kürbis-Hybriden	Flint	1	0,5 kg/ha	3	2758	Echter Mehltau, Stängelbrand	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Liebstöckel (Nutzung als frisches Kraut)	Bandur	1	3,5 l/ha auf schweren Böden; 3 l/ha auf mittleren oder leichten Böden	k.A.	2579	Einjährige zweikeim-blättrige Unkräuter, Ackerfuch-schwanzgras, Gemeiner Windhalm, Einjährige Rispe	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Linse	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	0	4091	Grüne Erbsen-blattlaus	N	F	BBCH 12–19
Linse	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha	7	4091	Grüne Erbsen-blattlaus	N	F	BBCH 30–87
Mohn	Decis Forte	1	0,075 l/ha	45	3554	Mohnkapselrüssler	J	F	BBCH 55–59
Mondbohne (ohne Hülse)	Luna Sensation	2	0,8	14	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warn-diensthinweis; BBCH 55–82
Mondbohne (ohne Hülse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	3	4091	Grüne Erbsen-blattlaus	N	F	BBCH 51–87
Moschuskürbis (mit genießbarer Schale)	Cupravit	4	3 l/ha	3	3405-901	Pilzliche Blattflecken-erreger (zur Befalls-minderung); Falscher Mehltau (zur Befalls-minderung)	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, ab BBCH 15
Ölkürbis (zur Erzeugung von Hybridsaatgut)	Cerone	3	0,75 l/ha	k.A.	3272	Verhinderung der Bildung männlicher Blüten	J	F	BBCH 12–61
Pastinake	Bandur	1	3 l/ha	90	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Pastinake	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	21	3021	Karotten-Wurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Pastinake	Movento 100 SC	2	0,45 l/ha	21	3021	Blattläuse	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Pastinake	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	21	2963	Karotten-Wurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Patisson (mit genießbarer Schale)	Cupravit	4	3 l/ha	3	3405-901	Pilzliche Blattflecken-erreger (zur Befalls-minderung); Falscher Mehltau (zur Befalls-minderung)	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, ab BBCH 15
Patisson (mit genießbarer Schale)	Flint	1	0,5 kg/ha	3	2758	Echter Mehltau, Stängelbrand	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Perlzwiebel	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim-blättrige Unkräuter	J	F	Voraufbau, bis BBCH 11 der Ungräser

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Perlwiebel	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Lauchmotte, Blattläuse, Minierfliege, Thripse	J	F	BBCH 11–49, 1. Laubblatt deutlich sichtbar – Zwiebellaub abgestorben, physiologische Ruhe
Perlwiebel (Nutzung als Trockenzwiebel)	Cupravit	6	2 l/ha	3	3405-901	Falscher Mehltau	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Petersilie (Nutzung als frisches Kraut)	Bandur	1	3,5 l/ha auf schweren Böden; 3 l/ha auf leichten oder mittleren Böden	k.A.	2579	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Ackerfuchschwanzgras, Gemeiner Windhalm, Einjährige Rispe	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Petersilie (Nutzung als frisches Kraut)	Folicur	1	1 l/ha	14	2670	Echter Mehltau	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, ab BBCH 43
Petersilie (zur Blattnutzung)	Luna Sensation	1	0,5 l/ha	14	3603	Echter Mehltau, Möhrenschräge, Sklerotinia	J	F	BBCH 41–49
Porree (Lauch)	Bandur	2	0,5 l/ha	28	2579	Wolfsmilchartige	J	F	BBCH 12–14
Porree (Lauch)	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	J	F	Bis 7 Tage nach dem Pflanzen, bis BBCH 13, bis BBCH 11 der Ungräser
Porree (Lauch)	Cupravit	6	2 l/ha	7	3405-901	Falscher Mehltau	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; ab BBCH 16
Porree (Lauch)	Flint	2	0,4 kg/ha	14	2758	Alternaria-Arten, Rost, Papierfleckenkrankheit, Blattfleckenkrankheit	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Porree (Lauch)	Folicur	3	1 l/ha	14	2670	Rost	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; ab BBCH 13
Porree (Lauch)	Luna Veggie	1	1 l/ha	21	3655	Purpurfleckenkrankheit, Rost	N	F	Bei Infektionsgefahr, BBCH 41–49
Porree (Lauch)	Serenade ASO	9	8 l/ha	k.A.	3536	Purpurfleckenkrankheit	J	F	BBCH 12–49
Puffbohne (Pferdebohne)	Bandur	1	4 l/ha	k.A.	2579	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen der Kultur
Puffbohne (Pferdebohne)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	0	4091	Grüne Erbsenblattlaus	N	F	BBCH 21–29
Puffbohne (ohne Hülse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	3	4091	Grüne Erbsenblattlaus	N	F	BBCH 51–87
Puffbohne (mit Hülse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	7	4091	Grüne Erbsenblattlaus	N	F	BBCH 51–87
Radieschen/ Rettich	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Erdräupen, Thripse	J	F	BBCH 11–49, 1. Laubblatt entfaltet – Dickenwachstum abgeschlossen; art-/sortentypische Form und Größe der Rübe, Wurzel bzw. Knolle erreicht
Radieschen	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	F	BBCH 12–49
Rettich	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	F	BBCH 12–49
Riesenbohne (ohne Hülse)	Luna Sensation	2	0,8	14	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis; BBCH 55–84
Riesenkürbis (mit genießbarer Schale)	Cupravit	4	3 l/ha	3	3405-901	Pilzliche Blattflecken-erreger (zur Befalls-minderung); Falscher Mehltau (zur Befalls-minderung)	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, ab BBCH 15

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Rote Rübe	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	F	BBCH 12–49
Rote Rübe	Tramat 500	3	0,66 l/ha	k.A.	2945	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	N	F	Nach dem Auflaufen, bis BBCH 19
Rotkraut	Cupravit	4	2 l/ha	7	3405-901	Kohlschwärze	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Rotkraut	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohlmottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Rotkraut	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Salat	Cadou SC	1	0,48 l/ha	32	3941	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	J	F	Bis 7 Tage nach dem Pflanzen, bis BBCH 19, bis BBCH 11 der Ungräser
Salat	Decis Forte	3	0,063 l/ha	7	3554	Erdräupen	N	F	1. Applikation: bei Befallsbeginn, BBCH 12–14, 2. Applikation: bei Neubefall, 3. Applikation: BBCH 49
Salat	Luna Sensation	1	0,8 l/ha	7	3603	Grauschimmel, Rhizoctonia solani	N	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, BBCH 13–49
Salat	Luna Sensation	1	0,8 l/ha	7	3603	Sclerotinia sclerotiorum	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, BBCH 13–49
Salat	Previcor Energy	3	2,5 l/ha	21	3109	Falscher Mehltau	N	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, BBCH 13–49
Salat	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Graufäule (Befalls-minderung), Weißstängeligkeit	N	F	BBCH 13–49
Salat	Sivanto Prime	1	0,625 l/ha	3	4091	Grünfleckige Kartoffelblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus, Grüne Pfirsichblattlaus, Braune Gänsedestelblattlaus, Salatblattlaus	N	F	BBCH 12–49
Salat	Teldor WG	2	1,5 kg/ha	7	3690	Grauschimmel	J	F	Bei Infektionsgefahr
Salatarten	Cupravit	4	2 l/ha	7	3405-901	Falscher Mehltau	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Salatarten	Movento 100 SC	2	0,45 l/ha	7	3021	Blattläuse	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–48
Salatarten	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	7	3021	Salatwurzellaus	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–48
Salatarten	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	7	2963	Blattläuse, Salatwurzellaus	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Schalotte	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	J	F	Voraufbau, bis BBCH 11 der Ungräser
Schalotte	Bandur	2	0,5 l/ha	49	2579	Wolfsmilch-Arten	J	F	Nach dem Auflaufen, BBCH 12–14 der Kultur
Schalotte	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Lauchmotte, Blattläuse, Minierfliege, Thripse	J	F	BBCH 11–49, 1. Laubblatt deutlich sichtbar – Zwiebellaub abgestorben, physiologische Ruhe
Schalotte	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha	7	2963	Zwiebelthrips	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 13–47
Schalotte (Nutzung als Trockenzwiebel)	Cupravit	6	2 l/ha	3	3405-901	Falscher Mehltau	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Schnittlauch (nur Bulben- anzucht)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Rost	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, ab BBCH 13
Schwarzwurzeln	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	F	BBCH 12–49
Spargel	Artist	1	2 kg/ha	k.A.	2913	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	7 bis 10 Tage nach dem Pflanzen bis kurz vor dem Durchstoßen; in Ertragsanlagen nach dem Stechen bis kurz vor dem Austrieb spritzen
Spargel	Cupravit	6	2 l/ha	k.A.	3405-901	Laubkrankheit	N	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, BBCH 31–93
Spargel	Luna Sensation	2	0,8 l/ha	k.A.	3603	Grauschimmel	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, nach der Ernte
Spargel	Luna Sensation	2	0,8 l/ha	k.A.	3603	Laubkrankheit, Spargelrost	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, nach der Ernte
Spargel (ab dem 2. Standjahr)	Sencor Liquid	1	0,9 l/ha	7	3381	Einjährige Rispe, Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, ausgenommen Klettenlabkraut	N	F	Vor der Stechperiode nach dem Aufrichten der Dämme oder nach der Stechperiode nach dem Einebnen der Dämme
Spargel (Ertragsanlagen)	Folicur	2	1,5 l/ha	k.A.	2670	Rost	N	F	Nach dem Stechen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Spargel (Ertragsanlagen)	Folicur	2	1,5 l/ha	k.A.	2670	Laubkrankheiten	J	F	Nach dem Stechen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Spargel (Junganlagen)	Folicur	2	1,5 l/ha	k.A.	2670	Rost	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Spargel (Junganlagen)	Folicur	2	1,5 l/ha	k.A.	2670	Laubkrankheiten	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Spargelbohne	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	0	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 21–29
Spargelbohne (mit Hülse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	7	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 51–87
Spargelbohne (ohne Hülse)	Luna Sensation	2	0,8	14	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warn-diensthinweis; BBCH 55–83
Spinat	Tramat 500	1	0,8 l/ha	k.A.	2945	Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter	J	F	Bis BBCH 09
Spinat und verwandte Arten	Cupravit	6	2 l/ha	14	3405-901	Falscher Mehltau	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Spitzkraut	Cupravit	4	2 l/ha	7	3405-901	Kohlschwärze	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Stangenbohne	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeim- blättrige Unkräuter	J	F	Voraufbau, bis 5 Tage nach der Saat, bis BBCH 11 der Ungräser
Stangenbohne	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	0	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 21–29
Stangenbohne (ohne Hülse)	Luna Sensation	2	0,8	14	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warn-diensthinweis; BBCH 55–81
Stangenbohne (ohne Hülse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	3	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 51–87
Stangenbohne (mit Hülse)	Luna Sensation	2	0,8	14	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warn-diensthinweis; BBCH 55–79

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Stangenbohne (mit Hülse)	Teldor WG	2	0,5 kg/ha (Pflanzhöhe bis 50 cm) 1,0 kg/ha (Pflanzhöhe 50 bis 125 cm) 1,5 kg/ha (Pflanzhöhe über 125 cm)	3	3690	Grauschimmel	J	F	Bei Infektionsgefahr, BBCH 60–69
Stangenbohne (mit Hülse)	Sivanto Prime	1	0,375 l/ha Pflanzhöhe bis 125 cm	7	4091	Grüne Erbsen- blattlaus	N	F	BBCH 51–87
Stangensellerie	Bandur	1	1 l/ha	60	2579	Ackerfuchsschwanz, Einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, Einjährige Rispe	J	F	Nach dem Pflanzen
Stoppelrübe	Decis Forte	1	0,075 l/ha	30	3554	Erdflöhe	N	F	Bei Befallsbeginn, BBCH 11–49
Weißkraut	Cupravit	4	2 l/ha	7	3405-901	Kohlschwärze	J	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, ab BBCH 13
Weißkraut	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl- mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Weißkraut	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Winterhecken- zwiebel	Bandur	2	0,5 l/ha	28	2579	Wolfsmilchartige	J	F	Nach dem Auflaufen, BBCH 12–14
Winterhecken- zwiebel	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Lauchmotte, Blatt- läuse, Minierfliege, Thripse	J	F	BBCH 11–49, 1. Laubblatt deutlich sichtbar – Zwiebellaub abgestorben, physiologische Ruhe
Wirsingkohl	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	3	3021	Blattläuse, Kohl- mottenschildlaus, Zwiebelthrips, Kohldrehherzmücke	N	F	Spritzen mit Netzmittel- oder Ölzusatz, BBCH 12–49
Wirsingkohl	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	3	2963	Blattläuse	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Wurzelpetersilie	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	21	3021	Karotten-Wurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Wurzelpetersilie	Movento 100 SC	2	0,45 l/ha	21	3021	Blattläuse	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Wurzelpetersilie	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	21	2963	Karotten-Wurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Wurzelpetersilie (zur Wurzel- nutzung)	Luna Sensation	1	0,5 l/ha	14	3603	Echter Mehltau, Möhrenschwärze, Sklerotinia	J	F	BBCH 41–49
Wurzelzichorie	Movento 100 SC	2	0,75 l/ha	21	3021	Salatwurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Wurzelzichorie	Movento 100 SC	2	0,45 l/ha	21	3021	Blattläuse	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49
Wurzelzichorie	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	21	2963	Salatwurzellaus	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, BBCH 12–49

Glashaus

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Zucchini	Cadou SC	1	0,5 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	J	F	Vor dem Auflaufen oder vor dem Pflanzen, bis BBCH 11 der Ungräser
Zucchini	Flint	1	0,5 kg/ha	3	2758	Echter Mehltau, Stängelbrand	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Zucchini (mit genießbarer Schale)	Cupravit	4	3 l/ha	3	3405-901	Pilzliche Blattflecken-erreger (zur Befalls-minderung); Falscher Mehltau (zur Befalls-minderung)	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, ab BBCH 15
Zuckermais	Laudis	2	1,15 l/ha	k.A.	2912	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	N	F	Nach dem Auflaufen der Kultur, BBCH 12–18
Zuckermais	Laudis	1	2,25 l/ha	k.A.	2912	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	N	F	Nach dem Auflaufen der Kultur, BBCH 12–18
Zwiebel	Cadou SC	1	0,48 l/ha	k.A.	3941	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	J	F	Voraufbau, bis BBCH 11 der Ungräser
Zwiebel	Cupravit	6	2 l/ha	3	3405-901	Falscher Mehltau	N	F	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis, BBCH 13–48
Zwiebel	Decis Forte	2	0,075 l/ha	7	3554	Lauchmotte, Blattläuse, Minierfliege, Thripse	J	F	BBCH 11–49, 1. Laubblatt deutlich sichtbar – Zwiebellaub abgestorben, physiologische Ruhe
Zwiebel	Luna Veggies	2	0,5 l/ha	7	3655	Zwiebelfäule, Laubkrankheiten (Befalls-minderung)	N	F	Bei Infektionsgefahr, BBCH 41–49
Zwiebel	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha	7	2963	Zwiebelthrips	N	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 13–47
Zwiebel	Roundup Powerflex	1	1,67 l/ha	k.A.	3437	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	J	F	Nach dem Auflaufen der Unkräuter, vor dem Auflaufen der Kultur, bis BBCH 05
Zwiebel (ausgenommen Frühlingszwiebel)	Folicur	2	1 l/ha	21	2670	Grauschimmel	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Zwiebel (Nutzung als Trockenzwiebel)	Bandur	2	0,5 l/ha	49	2579	Wolfsmilch-Arten	J	F	Nach dem Auflaufen, BBCH 12–14 der Kultur
Zwiebel (Nutzung als Trockenzwiebel)	Fandango	2	1,25 l/ha	14	3308	Falscher Mehltau	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Zwiebelgemüse (Nutzung als Trockenzwiebel)	Folicur	2	1 l/ha	21	2670	Botrytis-Arten, Blattfleckenkrankheit, Mehlkrankheit	J	F	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome

/// Indikationsübersicht unter Glas

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Blattgemüse	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit	N	GH	BBCH 13–49
Blattkohl (Jungpflanzen)	Folicur	2	1 l/ha	k. A.	2670	Pilzliche Blattfleckenenerreger	J	GH	Bei Befallsgefahr, ab BBCH 12
Bohnen (mit Hülse)	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit, Echter Mehltau	J	GH	BBCH 12–79
Chicoree	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis-Arten (nur bedingt wirksam)	J	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 14–49
Chinakohl	Serenade ASO	9	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit, Alternaria	J	GH	BBCH 12–49
Eissalat	Previcur Energy	2	2,5 l/ha	14	3109	Falscher Mehltau	J	GH	Nach dem Umpflanzen; BBCH 13–49
Endivie	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis-Arten (nur bedingt wirksam)	J	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 14–49
Endivie	Teldor WG	3	1,5 kg/ha	3	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr
Endivie (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Pythium-Arten	N	GH	Gießen; nach der Saat; vor dem Pflanzen
Erbse (mit Hülse)	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit, Echter Mehltau	J	GH	BBCH 12–79
Feldsalat (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Falsche Mehltau-pilze, Pythium-Arten	J	GH	Gießen; vor dem Pflanzen; bis BBCH 10
Flaschenkürbis (mit genießbarer Schale, Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Nach der Saat
Garten-Kürbis (mit genießbarer Schale, Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Nach der Saat
Gemüsefenchel (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Gießen; unmittelbar nach der Saat
Gurke	Flint	2	0,25 kg/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 0,375 kg/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm; 0,5 kg/ha Pflanzenhöhe über 125 cm	3	2758	Echter Mehltau, Stängelbrand	J	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Gurke	Flipper	5	16 l/ha	k. A.	4092	Blattläuse, Weiße Fliege, Kirschessigfliege, Gemeine Spinnmilbe, Tomatenrostmilbe	N	GH	BBCH 10–89
Gurke	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Pythium-Arten	N	GH	Gießen; vor sowie nach dem Pflanzen und nach dem Aufaufen bis BBCH 14
Gurke	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha/m Pflanzenhöhe; max. 1 l/ha	3	2963	Blattläuse, Weiße Fliege, Kalifornischer Blütenthrips	N	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Schadorganismen, bis BBCH 87

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Gurke	Serenade ASO	6	4 l/ha/m Pflanzenhöhe; max. 8 l/ha	k. A.	3536	Grauschimmel, Stängelbrand (nur bedingt wirksam)	N	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 13–89
Gurke	Teldor WG	3	1 kg/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 1,5 kg/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm	1	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 12–89
Gurke (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Gießen; unmittelbar nach der Saat
Gurke (NFT- und Substratkultur)	Previcur Energy	4	3 l/ha	3	3109	Pythium-Arten	J	GH	Dem Prozess- oder Umlaufwasser zugeben, nach dem Pflanzen
Gurke (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,45 l/ha 0,225 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Grüne Pflirsichblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Gurke (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,56 l/ha 0,28 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Weißer Fliege, Grüne Baumwollblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Karfiol (Jungpflanzen)	Folicur	2	1 l/ha	k. A.	2670	Pilzliche Blattfleckenenerreger	J	GH	Bei Befallsgefahr
Karfiol	Serenade ASO	9	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit, Alternaria	J	GH	BBCH 12–49
Knoblauch	Serenade ASO	9	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis-Blattfleckenkrankheit	J	GH	BBCH 12–49
Knollensellerie	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Botrytis-Arten (nur bedingt wirksam)	J	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 14–49
Kohl	Cupravit	2	2 l/ha	k. A.	3405-901	Kohlschwärze	J	GH	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 13
Kohl Gemüse (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k. A.	3109	Pythium-Arten, Falscher Mehltau	J	GH	Gießen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Kohlrabi	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Weißstängeligkeit	J	GH	BBCH 12–49
Kohlrabi (Jungpflanzen)	Folicur	2	1 l/ha	k. A.	2670	Pilzliche Blattfleckenenerreger	J	GH	Bei Befallsgefahr, ab BBCH 12
Kohlsprossen (Jungpflanzenanzucht)	Cupravit	2	2 l/ha	k. A.	3405-901	Kohlschwärze	J	GH	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 13
Kopfsalat	Previcur Energy	2	2,5 l/ha	14	3109	Falscher Mehltau	J	GH	Nach dem Umpflanzen; BBCH 13–49
Kräuter (frisch)	Teldor WG	2	1,5 kg/ha	7	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr
Kräuter (Gewürzkräuter)	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Grauschimmel, Echte Mehltaupilze (nur bedingt wirksam)	J	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 13–89
Kräuter (Gewürzkräuter)	Serenade ASO	6	8 l/ha	k. A.	3536	Sclerotinia-Arten (nur bedingt wirksam)	J	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 13–49
Melanzani	Luna Sensation	2	0,3 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 0,45 l/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm; 0,6 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm	3	3603	Grauschimmel	N	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 51–89
Melanzani	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha/m KH; max. 1 l/ha	3	2963	Blattläuse, Weiße Fliege, Kalifornischer Blütenthrips	N	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Schadorganismen, bis BBCH 87

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Melanzani	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	N	GH	Gießen; vor dem Pflanzen und nach dem Pflanzen; bis BBCH 14
Melanzani	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Grauschimmel (Befallsminderung)	N	GH	BBCH 21–89
Melanzani	Serenade ASO	6	4 l/ha/m Pflanzenhöhe; max. 8 l/ha	k.A.	3536	Pseudomonas-Arten, Bakterienbrand (nur bedingt wirksam)	N	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 13–89
Melanzani	Teldor WG	3	1 kg/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 1,5 kg/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm	1	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 12–89
Melanzani (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Gießen; nach der Saat
Melanzani (NFT- und Substratkultur)	Previcur Energy	4	3 l/ha	3	3109	Pythium-Arten; Phytophthora nicotianae	J	GH	Dem Prozess- oder Umlaufwasser zugeben, nach dem Pflanzen
Melanzani (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,45 l/ha 0,225 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Grüne Pfirsichblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Melone	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha/m KH; max.: 1 l/ha	3	2963	Blattläuse, Weiße Fliege, Kalifornischer Blütenthrips	N	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Schadorganismen, bis BBCH 87
Moschuskürbis (mit genießbarer Schale, Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Nach der Saat
Paprika	Luna Sensation	2	0,3 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 0,45 l/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm; 0,6 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm	3	3603	Grauschimmel	N	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 51–89
Paprika	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha/m KH; max.: 1 l/ha	3	2963	Blattläuse, Weiße Fliege, Kalifornischer Blütenthrips	N	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, bis BBCH 87
Paprika	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	N	GH	Gießen; vor dem Pflanzen und nach dem Pflanzen; bis BBCH 14
Paprika	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Grauschimmel (Befallsminderung)	N	GH	BBCH 21–89
Paprika	Serenade ASO	6	4 l/ha/m Pflanzenhöhe; max. 8 l/ha	k.A.	3536	Pseudomonas-Arten, Bakterienbrand (nur bedingt wirksam)	N	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 13–89
Paprika	Teldor WG	3	1 kg/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 1,5 kg/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm	1	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 12–89
Paprika (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Gießen; nach der Saat
Paprika (NFT- und Substratkultur)	Previcur Energy	4	3 l/ha	3	3109	Pythium-Arten, Phytophthora nicotianae	J	GH	Dem Prozess- oder Umlaufwasser zugeben, nach dem Pflanzen
Paprika (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,45 l/ha 0,225 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Grüne Pfirsichblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Patisson (mit genießbarer Schale, Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Nach der Saat

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Radieschen	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	GH	BBCH 12–49
Radieschen (Saatkultur)	Previcur Energy	2	2,5 l/ha	14	3109	Falsche Mehltäupilze	J	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, BBCH 12–49
Rettich	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Weißstängeligkeit, Blattfleckenkrankheit	J	GH	BBCH 12–49
Rettich (Saatkultur)	Previcur Energy	2	2,5 l/ha	14	3109	Falsche Mehltäupilze	J	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, BBCH 12–49
Riesenkürbis (mit genießbarer Schale, Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Nach der Saat
Rotkraut (Jungpflanzenanzucht)	Cupravit	2	2 l/ha	k.A.	3405-901	Kohlschwärze	J	GH	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 13
Rotkraut (Jungpflanzen)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Blattfleckenreger	J	GH	Bei Befallsgefahr
Rucola	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis-Arten (nur bedingt wirksam)	J	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 14–49
Salat, Vogelsalat, Rucola, Kresse	Luna Sensation	2	0,8 l/ha	7	3603	Grauschimmel, Weißstängeligkeit	J	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 12–49
Salat	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Graufäule, Bakterienbrand (Befallsminderung), Weißstängeligkeit	N	GH	BBCH 13–49
Salat	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Grauschimmel, Sclerotinia-Arten (nur bedingt wirksam)	J	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 13–49
Salat	Teldor WG	2	1,5 kg/ha	7	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr
Salat (Jungpflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	N	GH	Gießen; nach der Saat; vor dem Pflanzen
Salatarten	Movento 150 OD	2	0,5 l/ha	7	2963	Blattläuse	N	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, BBCH 12–49
Salatarten (Jungpflanzenanzucht)	Cupravit	2	2 l/ha	k.A.	3405-901	Falscher Mehltau	J	GH	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 13
Schalotte	Serenade ASO	9	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis-Blattfleckenkrankheit	J	GH	BBCH 12–49
Spargel	Serenade ASO	9	8 l/ha	k.A.	3536	Botrytis, Weißstängeligkeit, Alternaria	J	GH	BBCH 12–49
Spitzkraut (Jungpflanzenanzucht)	Cupravit	2	2 l/ha	k.A.	3405-901	Kohlschwärze	J	GH	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 13
Spitzkraut (Jungpflanzen)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Blattfleckenreger	J	GH	Bei Befallsgefahr
Stangenbohne	Teldor WG	3	1 kg/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 1,5 kg/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm	1	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 55–79
Stangenbohne (Nutzung mit Hülse)	Flint	1	0,25–0,5 kg/ha	3	2758	Bohnenrost, Brennfleckenkrankheit	J	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen
Tomate	Flipper	5	16 l/ha	k.A.	4092	Blattläuse, Weiße Fliege, Kirschesigfliege, Gemeine Spinnmilbe, Tomatenrostmilbe	N	GH	BBCH 10–89

Kultur	Produkt/ Handels- bezeichnung	Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Wartezeit in Tagen	Amtl. Pfl.Reg.Nr.	Schad- organismus	Artikel 51	F/GH	Anwendung
Tomate	Luna Sensation	2	0,3 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm; 0,45 l/ha Pflanzenhöhe 50–125 cm; 0,6 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm	3	3603	Grauschimmel	N	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 51–89
Tomate	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha/m KH; max.: 1 l/ha	3	2963	Blattläuse, Weiße Fliege, Kalifornischer Blütenthrips	N	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, bis BBCH 87
Tomate	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	N	GH	Gießen; vor dem Pflanzen und nach dem Pflanzen; bis BBCH 14
Tomate	Serenade ASO	6	8 l/ha	k.A.	3536	Grauschimmel (Befallsminde rung)	N	GH	BBCH 21–89
Tomate	Serenade ASO	6	4 l/ha/m Pflanzenhöhe; max. 8 l/ha	k.A.	3536	Pseudomonas-Arten, Bakterienbrand (nur bedingt wirksam)	N	GH	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, BBCH 13–89
Tomate	Teldor WG	3	1,0–1,5 kg/ha	1	3690	Grauschimmel	N	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 12 bis BBCH 89
Tomate (Jung- pflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Gießen; nach der Saat
Tomate (aus- genommen Kirschtomate)	Cerone	1	0,9 l/ha	7	3272	Reifebeschleunigung	J	GH	Bis 7 Tage vor der Ernte, BBCH 81–85
Tomate (NFT- und Substratkultur)	Previcur Energy	4	3 l/ha	3	3109	Pythium-Arten, Phytophthora nicotianae	J	GH	Dem Prozess- oder Umlaufwasser zugeben, nach dem Pflanzen
Tomate (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,45 l/ha 0,225 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Grüne Pfirsichblatt- laus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Tomate (UG)	Cupravit	3	2–4 l/ha	7	3405 -901	Kraut- und Braunfäule, Blattfleckenkrankheit, Dürrfleckenkrankheit (alle zur Befallsminde rung)	J	GH	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 51
Wassermelone (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,45 l/ha 0,225 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Grüne Pfirsichblatt- laus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Wassermelone (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,56 l/ha 0,28 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Weißer Fliege, Grüne Baumwollblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Weißkraut (Jungpflanzen- anzucht)	Cupravit	2	2 l/ha	k.A.	3405 -901	Kohlschwärze	J	GH	Bei Infektionsgefahr, ab BBCH 13
Weißkraut (Jungpflanzen)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Blattflecken- erreger	J	GH	Bei Befallsgefahr
Wirsingkohl (Jungpflanzen)	Folicur	2	1 l/ha	k.A.	2670	Pilzliche Blattflecken- erreger	J	GH	Bei Befallsgefahr
Zucchini	Movento 150 OD	4	0,5 l/ha/m KH; max. 1 l/ha	3	2963	Blattläuse, Weiße Fliege, Kalifornischer Blütenthrips	N	GH	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, bis BBCH 87
Zucchini	Teldor WG	3	1,5 kg/ha	1	3690	Grauschimmel	J	GH	Bei Infektionsgefahr, BBCH 12–89
Zucchini (mit genießbarer Schale, Jung- pflanzenanzucht)	Previcur Energy	2	3 ml/m ²	k.A.	3109	Pythium-Arten	J	GH	Nach der Saat
Zucchini (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,45 l/ha 0,225 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Grüne Pfirsichblatt- laus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus	N	GH	BBCH 12–89
Zucchini (Substratkultur)	Sivanto Prime	2	0,56 l/ha 0,28 l/ha/m Pflanzenhöhe	3	4091	Weißer Fliege, Grüne Baumwollblattlaus	N	GH	BBCH 12–89

Mit diesem Dokument möchten wir, die Bayer Austria Ges.m.b.H., 1120 Wien, Am Europlatz 1, (nachstehend „uns“, „unsere“ oder „wir“) Sie gemäß Art 13 und 14 DSGVO als Verantwortlicher darüber informieren, wie Ihre personenbezogenen Daten und/oder jene Ihrer Mitarbeiter, mit denen wir in Kontakt stehen, bei uns gehandhabt werden.

1. Umgang mit und Herkunft von personenbezogenen Daten

Wenn im Folgenden nicht anderweitig angegeben, liegt die rechtliche Grundlage für die Handhabung Ihrer personenbezogenen Daten im Vorliegen einer entsprechenden Einwilligung, in der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses, in der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und/oder in der Verfolgung unseres berechtigten Interesses insbesondere zur Förderung unserer Produkte und Leistungen begründet.

a. Kundenbeziehungsmanagement

Wir arbeiten mit Systemen für das Kundenbeziehungsmanagement, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten und/oder jene Ihrer Mitarbeiter, mit denen wir in Kontakt stehen, verarbeiten:

- **„Kontaktinformationen, Stammdaten und Informationen zur Kundenbeziehung/-historie“:** Zu dieser Kategorie von personenbezogenen Daten gehören Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-/Fax-/Handynummer, E-Mail-Adresse, andere Informationen für die Online-Kontaktaufnahme, Kontodaten, Kundennummer, Bestelldaten (inkl. damit zusammenhängender Informationen, wie z. B. Verträge, Purchase Orders, Zahlungskonditionen, Rechnungen, Rabatte, Retouren, Reklamationen), Daten über die Teilnahme an einem Bonus- bzw. Kundenbindungsprogramm und über den Absatz unserer Produkte sowie Informationen zu Ihrem allfälligen Betrieb (z. B. Zahlungen an Sie, Betriebsform/-größe, Anbaufläche und angepflanzte Kulturen).
- **„Informationen über Ihre Interessen und Ihre Anfragen“:** Stets mit dem Ziel im Blick, Ihre Erfahrungen mit unseren Produkten und Leistungen zu verbessern, dokumentieren und analysieren wir zudem unsere Interaktion(en) bzw. unsere persönlichen Kontakte mit Ihnen, so z. B. wenn wir Sie besucht haben (Besuchsbericht) oder Ihnen Material auf einem Tablet zeigen. Es wird dokumentiert, welche Themen wir mit Ihnen besprochen bzw. Ihnen gezeigt haben, wie lange und in welcher Reihenfolge Ihnen die einzelnen Themen präsentiert wurden und Ihre Reaktion darauf. In unseren Systemen wird gegebenenfalls auch die Beantwortung Ihrer Anfragen erfasst.
- **„Informationen zu Veranstaltungen“:** Zum Zweck der Einladung, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungsteilnahmen werden die von Ihnen angegebenen Daten von uns verarbeitet und - ausschließlich im für die Buchung und Registrierung erforderlichen Umfang – allenfalls an ein von uns beauftragtes/ausgewähltes Reisebüro/Hotel, ein von uns ausgewähltes Transportmittelunternehmen bzw. - wenn erforderlich – an den Veranstalter (innerhalb und außerhalb der EU) weitergegeben.

Derartige Informationen basieren entweder auf Ihren eigenen Angaben/Anfragen, einer Einschätzung unserer Mitarbeiter aufgrund persönlicher Kontakte mit Ihnen (z. B. Vertriebsmitarbeiter/Kundendienst, Veranstaltungen, digitale Plattformen), auf öffentlich verfügbaren Quellen (z. B. Webseiten) oder dem Informationserhalt von Dritten, wie Marktforschungsagenturen, Login-Providern, Kooperationspartnern (z. B. bei Gewinnspielen, (Rabatt-)Aktionen) oder kommerziellen Datenanbietern bzw. Adresshändlern. Wir verwenden diese Daten, um unsere Interaktionen mit Ihnen zu dokumentieren, unsere Ihnen angebotenen sowie weitere verwandte Produkte und Leistungen aus unserem Sortiment zu fördern, um Ihnen Informationen über unsere, von Ihnen ver- bzw. angewendeten oder ähnliche Produkte und Leistungen bereitzustellen, um ein länderübergreifendes Verzeichnis von potentiellen Geschäftspartnern zu führen, um Sie bei Bedarf für künftige Kooperationen anzusprechen oder Sie zu beauftragen, um Ihre allfällige Teilnahme an Veranstaltungen zu koordinieren, um allfällige Bestellungen (inkl. Reklamationen oder Teilnahme an einem Bonus- bzw. Kundenbindungsprogramm) auszuführen, um unseren buchhalterischen Verpflichtungen nachzukommen, um Sie für Ihre Leistungen zu bezahlen oder Ihnen Ihre Ausgaben zurückzuerstatten sowie für die sonstigen in diesen Datenschutzinformationen genannten Zwecke.

b. Marktforschungsprojekte

Wir arbeiten gelegentlich mit unabhängigen Marktforschungsinstituten zusammen, welche in unserem Auftrag Marktforschungsstudien mit Fokus auf unsere Produkte und Leistungen bzw. auf die Verbesserung unserer Beratungsleistungen durchführen. Um diese Erhebungen durchzuführen, geben wir Ihre Kontaktdaten allenfalls an sorgfältig ausgewählte Marktforschungsagenturen weiter.

c. Bereitstellung von Mitteilungen

Auf Basis Ihrer gesonderten, freiwilligen Einwilligung verwenden wir Ihre Kontaktinformationen, um Ihnen über E-Mail oder andere elektronische Kommunikationsmethoden (z. B. Fax, Textnachrichten, Nachrichten über soziale Netzwerke, Instant Messaging, Chats auf Webseiten oder Remote Detailing einschließlich Kundendienst auf Abruf) – sofern diese zwischen Ihnen und Bayer genutzt werden – sowie telefonisch Informationen über unsere, von Ihnen ver- bzw. angewendeten Produkte sowie über verwandte Produkte und Leistungen (einschließlich Vorschläge zu Produkten und Dienstleistungen aus unserem Produktangebot) und über Veranstaltungen bereitzustellen sowie um Sie für Marktforschung wie Zufriedenheitsumfragen und Studien/Erhebungen zu unseren Produkten und Leistungen zu kontaktieren. Dies kann die Anzeige von auf Ihre Interessen zugeschnittener benutzerdefinierter Werbung auf unseren oder anderen Webseiten und in Apps umfassen. Für Mitteilungen, die über E-Mail oder andere elektronische Kommunikationsmethoden („Mitteilungen“) sowie Telefon übermittelt werden, werden wir vorab Ihre Einwilligung einholen, wenn eine solche Einwilligung noch nicht vorliegen sollte. Jede elektronische Mitteilung, die wir an Sie senden, enthält eine Option, mit der Sie Ihre Einwilligung einfach widerrufen können.

d. Analyse, wie Sie unsere Mitteilungen nutzen

Damit wir unsere elektronischen Mitteilungen an Ihre Anforderungen und Vorlieben anpassen können, analysieren wir bzw. von uns beauftragte Leistungsanbieter (siehe 2.a.), wie Sie unsere Mitteilungen nutzen. Dazu gehört z. B., ob Sie diese geöffnet

haben und auf welche Weise Sie diese genutzt haben (z. B. auf welche Links/Auswahlmöglichkeiten bzw. Inhalte Sie geklickt haben).

e. Bestell- und Zahlungsabwicklung

Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, verarbeiten wir Ihre Kontakt- und Zahlungsinformationen, um Ihre Bestellung zu bearbeiten, den Versand an Sie zu organisieren, Ihnen Rechnung zu legen und Ihre Zahlungen automatisiert zuzuordnen. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist der Abschluss und die Erfüllung des Kaufvertrages für die bestellten Waren oder Dienstleistungen. Wenn Sie sich für die Zahlung auf Rechnung entscheiden, führen wir zur Wahrung berechtigter Interessen von Bayer eine Kreditprüfung durch, um uns vor Zahlungsausfällen zu schützen.

2. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten bzw. personenbezogene Daten Ihrer Mitarbeiter, mit denen wir in Kontakt stehen, für die bereits genannten Zwecke und in den folgenden Fällen an Dritte weiter bzw. bieten diesen Zugriff darauf:

- Wir arbeiten mit spezialisierten Unternehmen zusammen, die uns dabei helfen, unsere Produkte und Leistungen anzubieten (z. B. Druckereien oder Marketingagenturen für personalisierte Aussendungen, IT-Dienstleister, Cloud Service Provider, Call Center etc.). Diese Leistungsanbieter werden von uns sorgfältig ausgewählt und unterliegen einer regelmäßigen Kontrolle. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese Anbieter, die auf der jeweiligen Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung beruht, findet nur auf unsere Anweisung und unter strikter Einhaltung unserer Richtlinien statt.
- Ihre oben genannten personenbezogenen Daten werden u.U. an (andere) Bayer-Partner (z. B. Logistik- und Zustellpartner, Reisebüros/Hotels/Transportmittelunternehmen, unabhängige Marktforschungsinstitute wie oben in Abschnitt 1.b beschrieben, unsere Datenanbieter wie oben in Abschnitt 1.a beschrieben, um Ihre Daten stets aktuell und korrekt zu halten) oder an andere Bayer-Konzerngesellschaften (abrufbar unter: www.bayer.com/en/bayer-worldwide.aspx) weitergegeben. Dies ist der Fall, wenn diese Partner oder Konzerngesellschaften an der Bereitstellung/Vermarktung von Produkten/Leistungen oder Mitteilungen an Sie oder zu sonstigen in Punkt 1. genannten Zwecken beteiligt werden (müssen) und/oder dies zur Vertragserfüllung und/oder zur Wahrung berechtigter Interessen von Bayer erforderlich ist.
- Wenn es aufgrund rechtlicher Vorgaben (z. B. Auskunfts- oder Meldepflichten) oder aufgrund unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, kann es sein, dass wir Daten allenfalls an Behörden oder an sonstige öffentliche Einrichtungen weitergeben.
- Im Falle der Vorbereitung, des Abschlusses und/oder der Durchführung der Übertragung eines Geschäftsbereiches an Bayer-Konzerngesellschaften und/oder an (potentielle) Nachfolger/Dritte; dasselbe gilt für Kooperation jeglicher Art.
- Einige Ihrer Daten können auch an Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt und dort verarbeitet werden. In diesen Ländern werden u.U. geringere Anforderungen an den Datenschutz gestellt als in europäischen Ländern. Wo immer erforderlich, stellen wir sicher, dass Ihre Daten ausreichend geschützt werden, so z. B. durch den Abschluss spezieller Vereinbarungen mit dem jeweiligen Datenimporteur. Auf Anfrage unterrichten wir Sie gerne über die von uns (gegebenenfalls) getroffenen geeigneten Garantien.

3. Aufbewahrung von personenbezogenen Daten

Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie dies für die kontinuierliche Pflege der Kundenbeziehung mit Ihnen bzw. für die weiteren, oben genannten Zwecke erforderlich ist. Ihre personenbezogenen Daten werden nach 2 Jahren Inaktivität 3 Jahre lang archiviert und dann gelöscht, es sei denn, eine andere Vorgehensweise ist aufgrund der oben genannten Zwecke erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten, anwendbare Verjährungsfristen, aufgrund einer Vertragsvereinbarung oder bei einer drohenden Rechtsstreitigkeit).

4. Informationen zu Ihren Rechten, Kontaktinformationen

Laut geltenden Datenschutzgesetzen stehen Ihnen im Allgemeinen die folgenden Rechte zu:

- Auskunftsrecht bezüglich der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten über Sie
- Recht auf Richtigstellung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
- Widerspruchsrecht bezüglich einer Verarbeitung zur Wahrung berechtigter eigener Interessen, des öffentlichen Interesses oder aus Gründen des Profiling, es sei denn, wir können nachweisen, dass zwingende, berechtigte Gründe vorliegen, die über Ihren Interessen, Rechten und Ihrer Freiheit stehen oder dass diese Verarbeitung zum Zweck der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erfolgt. Bei Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken haben Sie jederzeit ein Widerspruchsrecht.
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Recht der Anzeige oder Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde
- Sie können Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufen.

Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an die Datenschutz-Abteilung der Bayer Austria Ges.m.b.H., 1120 Wien, Am Europlatz 1, Tel: 01/711 46-0, E-mail: datenschutz.austria@bayer.com

5. Anpassung der Datenschutzinformationen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Aktualisierungen werden auf unseren Websites veröffentlicht und gelten ab ihrer Publikation. Wir empfehlen Ihnen daher, unsere Seiten regelmäßig zu besuchen, um sich über gegebenenfalls erfolgte Aktualisierungen zu informieren.



Hinweise für die Zulassungen für „Geringfügige Anwendungen“ gemäß Art. 51 der VO 1107/2009 Gefahr in Verzug und Lückenindikationen:

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Erklärung zu Produktprofilen:

In den Produktprofilen werden Aufwandmengen und Anwendungstermine als Praxisempfehlung angegeben. Diese können von den zugelassenen Indikationen insofern abweichen, als für einzelne Produkte auch höhere Aufwandmengen und weitere Anwendungsfenster möglich sind. Alle zugelassenen Indikationen und Auflagen sind unter agrار.bayer.at abrufbar.

Die bisherigen Broschüren verlieren mit dem Erscheinen dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

Satz- und Druckfehler bzw. Irrtümer vorbehalten.

® = eingetragenes Warenzeichen der Bayer Gruppe.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.



Beratungsdienst 01/711 46-2835

E-Mail cropscience.austria@bayer.com

www.agrar.bayer.at



Bayer Austria Ges.m.b.H.
1120 Wien, Am Europlatz 1

Stand: Dezember 2023

Impressum:

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Bayer Austria Ges.m.b.H.,
Am Europlatz 1, 1120 Wien
Konzept, Design und Gestaltung: ghost.company Werbeagentur Austria GmbH,
Donauwörther Straße 12, 2380 Perchtoldsdorf
Druck: Print Alliance GmbH, Druckhausstraße 1, 2540 Bad Vöslau

