

Herbst
//// 2026

Mateno[®]

NEU

TRIOSET

*Lass kein Gras
darüber wachsen*



Roundup[®] Future | Folicur[®] | Decis[®] Forte | Tilmor[®] | Redigo[®] Pro | MagicTrap 2



Alle Infos unter: www.agrar.bayer.at

Lass kein Gras darüber wachsen.

Dreifach stark gegen Windhalm und Unkräuter im Wintergetreide.

Herbizid-Pack

Gegen Windhalm und Unkräuter in allen Wintergetreidearten (außer Winterhafer).

Pfl.Reg.Nr.

Mateno® Duo	4616-0
Cofeno®	4303-901

Wirkstoffe

Diflufenican	100 g/l
Aclonifen	500 g/l
Prosulfocarb	800 g/l

Wirkungsweise

HRAC-Code 12, 32, 15

Anwendung

Vom Voraufbau bis zum 3-Blattstadium des Getreides.
Empfohlene Saattiefe: mind. 3 cm.

Empfohlene Aufwandmenge

0,35 l/ha Mateno Duo
+ 1,5 l/ha Cofeno

Gewässerabstand

15/10/5/1 m
Keine Anwendung auf abtragsgefährdeten Flächen neben Oberflächengewässern.

Gebindegrößen

- 5,55 l für 3 ha
1,05 l Mateno Duo
+ 4,5 l Cofeno
- 16,65 l für 9 ha
3,15 l Mateno Duo
+ 3 x 4,5 l Cofeno

- + Mit einzigartigem Wirkmechanismus von Aclonifen
- + Effektive Resistenzvorbeugung durch 3 verschiedene, nicht resistenzgefährdete Wirkstoffklassen
- + Zuverlässige Wirkung gegen ALS- oder ACCase-resistenten Windhalm
- + Breite Wirkung gegen Unkräuter und Ungräser
- + Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Wirkung

Die 3 Wirkstoffe ergänzen sich ideal mit ihrer starken Boden- und Blattwirkung gegen Ungräser und Unkräuter. Mateno Trio Set kann deshalb flexibel vom Voraufbau bis zum frühen Nachaufbau (3-Blattstadium des Wintergetreides) eingesetzt werden. Optimaler Anwendungstermin: im Keimblattstadium der Unkräuter.


Die Vorteile

Mateno Trio Set kann gemischt werden

- mit 1,5 l/ha Cofeno zusätzlich, wenn auch eine Wirkung gegen Ackerfuchsschwanz oder Raygräser benötigt wird (in Wintergerste und Roggen nur im Voraufbau).
- mit 25 g/ha Express SX oder 75 ml/ha Saracen für eine zuverlässige Wirkung gegen Kornblume oder Kamille im 3-Blattstadium des Wintergetreides.
- mit Decis Forte zur Bekämpfung von Blattläusen (als Überträger des Gelbverzwergungsvirus)

EMPFEHLUNGEN IN WINTERGERSTE, -WEIZEN, ROGGEN U. TRITICALE

In Wintergerste und Roggen im Nachaufbau nur auf abgetrocknetem Bestand anwenden.




Lass kein Gras darüber wachsen.

Dreifach stark gegen Windhalm und Unkräuter im Wintergetreide.

Mateno®

NEU TRIO SET

Produkt		Mateno® Trio Set** Mateno® Duo + Cofeno®	Mateno® Duo + Cadou® SC*	Mateno® Duo + Lentipur® 500
Aufwandmenge/ha		0,35 + 1,5 L	0,35 + 0,25 L	0,35 + 1,5 L
Unkräuter	Ackersteinsame			
	Ackerstiefmütterchen			
	Ausfallraps			
	Besenrauke			
	Ehrenpreis			
	Frauenmantel			
	Klatschmohn			
	Kamille			
	Klettenlabkraut			
	Kornblume	aufgelaufen	aufgelaufen	
	Pfeilkresse			
	Rainkohl			
	Storchschnabel			
	Taubnessel			
Ungräser	Vergißmeinnicht			
	Vogelmiere			
	Windhalm			
	Rispe			
	Raygräser			
	Ackerfuchsschwanz			
Trespe				



*Oder Alternativprodukt

**Wirkungsspektrum Anwendung früher Nachauflauf bei idealen Anwendungsbedingungen

Die solide Basis gegen Unkräuter, ...

Der flexible Mischpartner im Herbst.

Mateno®

Jetzt auch als Einzelprodukt verfügbar!

DUO

- + Der ideale Mischpartner zu flufenacethältigen Produkten (Cadou® SC, u.a.), Cofeno® oder Lentipur® 500
- + Breite Wirkung gegen Unkräuter mit Boden- und Blattwirkung
- + Verstärkt die Wirkung gegen Ungräser der Mischpartner

Die Möglichkeiten

Mateno Duo ermöglicht individuelle Herbizidstrategien:

1. Mit **0,25 l Cadou® SC + 0,35 l/ha Mateno® Duo** kann der langjährig bewährte Mateno® Pack ersetzt werden. Wird die Aufwandmenge von Cadou® SC auf 0,5 l/ha erhöht, ist auch eine gute Wirkung gegen Trespe, Ackerfuchsschwanz und Raygräser gegeben. Vorgekaufte flufenacethaltige Herbizide müssen bis Anfang Dezember 2026 aufgebraucht werden *(Cadou SC: bis 5.12.2026).
2. Mit **0,35 l Mateno® Duo + 1,5 l/ha Lentipur® 500** im 3-Blattstadium des Wintergetreides wird eine breite Wirkung gegen Windhalm und Unkräuter (inkl. Kornblume) erzielt.

* Aufbrauchsfristen weiterer flufenacethaltiger Produkte sind dem Pflanzenschutzregister zu entnehmen.



Herbizid

Die innovative Basislösung in allen Wintergetreidearten (außer Winterhafer).

Pfl.Reg.Nr.

Mateno® Duo 4616-0

Zulassung

0,7 l/ha im Voraufbau von Winterweizen und -triticale gegen Windhalm, Rispe und Unkräuter.

0,35 l/ha im Voraufbau von Wintergerste und -roggen bzw. im Nachauflauf bis zum 3-Blattstadium in Wintergerste, -weizen, Roggen, Triticale und Dinkel gegen Unkräuter.

Gewässerabstand

Bei 0,35 l/ha:
5/5/1/1 m
5 m Grünstreifen auf abtragsgefährdeten Flächen

Gebindegröße

1,05 l

Herbizid

Bodenherbizid für
Wintergetreide, Kartoffel,
Sonnenblume, Ackerbohne,
Futtererbse, ...

Pfl.Reg.Nr.

Cofeno®. 4303-901

Wirkstoff

Prosulfocarb 800 g/l

Zulassung

5 l/ha vom Voraufbau bis Beginn
Bestockung von Wintergerste,
-weizen, -triticale und Roggen
gegen Ungräser und Unkräuter.

Gewässerabstand

15/10/5/1 m
Keine Anwendung auf
abtragsgefährdeten Flächen
neben Oberflächengewässern.

Gebindegröße

4,5 l

- +** Der ideale Mischpartner für das Mateno Trio Set, um die Wirkung gegen Ackerfuchsschwanz oder Raygras zu verstärken.

Die Möglichkeiten

- 1,5 l/ha Cofeno + Mateno Trio Set** (= 0,35 l Mateno Duo + 1,5 l/ha Cofeno) im Voraufbau von WINTERGERSTE bzw. ROGGEN.
- 1,5 l/ha Cofeno + Mateno Trio Set** (= 0,35 l Mateno Duo + 1,5 l/ha Cofeno) vom Voraufbau bis zum 3-Blattstadium des WINTERWEIZENS bzw. TRITICALE. Der ideale Anwendungstermin ist beim Durchspitzen vom Ackerfuchsschwanz bzw. Raygras.



Ackerfuchsschwanz



Raygras / Weidelgras



Taube Trespe / Dachtrespe

Weil jedes Prozent Wirkung zählt Optimale Bedingungen schaffen oder nutzen

Bodenherbizide benötigen ein feinkrümeliges Saatbett und entsprechende Bodenfeuchte, um eine gute Wirkung entfalten zu können.

- Keine Altverunkrautung aus dem Sommer ins Getreide „mitnehmen“.** Größere Ungräser und Unkräuter von der Getreide- oder Rapsstoppel können im Getreide nicht bekämpft werden. Sie sollten vor der Bodenbearbeitung zum Getreideanbau mit Roundup Future bekämpft werden.
- Je stärker der Ungrasdruck ist, desto später sollte der Saattermin sein.** Versuche zeigen, dass der Ungrasdruck durch einen um 2 Wochen späteren Saattermin um rund 50% reduziert werden kann. Zudem ist dadurch die Vorwinterentwicklung schwächer und langsamer. Mit einem „Scheinsaatbett“ bringen Sie Ungräser zum Auflaufen, die vor dem Anbau mit Roundup Future bekämpft werden können.
- Eine mögliche Restverunkrautung durch Ackerfuchsschwanz, Raygras oder Trespe sollte im Frühjahr rund 10 Tage nach Vegetationsbeginn mit Gräserherbiziden bekämpft werden.

Beizmittel

Gegen pilzliche Schaderreger in Weizen, Gerste, Roggen, Triticale und Hafer.

Pfl.Reg.Nr. 3762-0

Wirkstoffe

Prothioconazol 150 g/l
Tebuconazol 20 g/l

Empfohlene Aufwandmenge

50-66,7 ml/dt Saatgut

Gebindegrößen

5 l, 200 l

Redigo Pro erfasst ein breites Spektrum wichtiger Pilzkrankheiten. Dadurch werden ein sicherer Pflanzenaufbau sowie bei Wintergetreide eine zuverlässige Überwinterung und ein guter Wachstumsstart im Frühjahr gewährleistet.

- +** Für alle Getreidearten (ausgenommen Dinkel)
- +** 2 hochwirksame Wirkstoffe schützen Saatgut und Jungpflanze
- +** Breites Wirkungsspektrum, inklusive Flugbrand
- +** Stark gegen Fusarium und Schneeschimmel



5 l für 7,5 bis 10 t Getreide

Zur Stoppelbehandlung.

Vor dem Anbau der Folgekultur für einen sauberen Start und effektives Resistenzmanagement.

Herbizid

Nicht selektives Herbizid zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern.

Pfl.Reg.Nr. 4471-0

Wirkstoff:

Glyphosat 500 g/l

Formulierung

Wasserlösliches Konzentrat mit einzigartigem Formuliersystem.

Aufwandmenge

Stoppelbehandlung
2,4 l/ha

Gewässerabstand

1m

Gebindegrößen

5 l, 15 l

- +** Wurzeltiefe und nachhaltige Wirkung
- +** Hochwertige, konzentrierte Formulierung:
 - kein zusätzliches Netzmittel nötig
 - sicher bei hartem Wasser
- +** Kein Zeitdruck:
 - sehr kurze Wartezeit bis zum Umbruch

Empfehlung:

- Nach der Ernte und vor dem Anbau der Folgekultur.
- **1,5 l/ha Roundup Future** gegen Ackerfuchsschwanz, Ausfallgetreide und Raygras bis zur Bestockung, Ausfallraps bis 5 cm Wuchshöhe sowie Rispengras, Kamille und Kornblume bis zum 6-Blatt-Stadium.
- **2,4 l/ha Roundup Future** zur Bekämpfung von Ausfallgetreide ab der Bestockung, Ausfallraps bis 10 cm Wuchshöhe, Ehrenpreis, Hundskamille, Quecke und Rispengras ab der Bestockung, Raygras bis zum Schossbeginn, Trespe sowie Vogelmiere.

Bodenbearbeitung bei Samenunkräutern /-gräsern nach frühestens 2 Tagen, bei Wurzelunkräutern /-gräsern nach frühestens 1 Woche.

MagicTrap 2

Die digitale Gelbschale.

Im Feld sein, ohne im Feld zu sein.

Einfach über diesen QR-Code kaufen.



- + Vereinfacht die gezielte Bekämpfung vom Rapserrfloh im Herbst.
- + Mit hoch **auflösender Kamera**, die zweimal täglich Fotos auf Ihr Smartphone schickt.
- + Mit **künstlicher Intelligenz**, die die Anzahl der Erdflöhe in der Gelbschale zählt.
- + **Bessere Signalstärke** inkl. Roaming auf abgelegenen Flächen.
- + **Höhere Bildqualität** – kleiner Schädling, klare Erkennung
- + **Robuster** bei Wind und Wetter
- + **GPS-Tracking**



Benjamin Fleck stellt die MagicTrap2 kurz vor.



Zeit sparen

Überwachung aus der Ferne



Einfache Handhabung

Schnell aufgebaut und einsatzbereit



Rechtzeitig und genau

Bescheid wissen



Fort mit Erdfloh und Blattlaus in Raps und Getreide.

Einfach schneller als die Schädlinge.

Insektizid

Kontakt- und Ateminsektizid gegen beißende und saugende Schädlinge.

Pfl.Reg.Nr. 3554-0

Wirkstoff
Deltamethrin 100g/l

Empfohlene Aufwandmenge
62 ml/ha

Anwendung
In Weizen, Gerste, Hafer, Raps etc.

Gewässerabstand
62 ml/ha: -/-/15/5 m

Gebindegrößen
1 l für 16 ha

Decis Forte ist ein hochwirksames Pyrethroid gegen Blattläuse (als Überträger des Gelbverzwergungsvirus) oder Rapserrfloh.

- + Schnellste Anfangswirkung durch raschen Knock-Down-Effekt
- + Kontakt- und Fraßwirkung
- + Die starke Repellentwirkung reduziert die Saugaktivität von Blattläusen, Zikaden u. v. m.
- + Breit mischbar

Blattlaus



Rapserrfloh



Tilmor®

Phamos gegen Phoma.

Fit für den Winter und mehr Ertrag.

Fungizid

Rapsfungizid gegen Phoma.

Pfl.Reg.Nr. 3307-0

Wirkstoffe

Prothioconazol 80 g/l
Tebuconazol 160 g/l

Empfohlene Aufwandmenge

0,8–1 l/ha

Anwendungszeitraum

Im Herbst ab dem 4- bis 8-Blattstadium (~ 80 % Bodendeckung) des Bestandes.

Gewässerabstand

10/5/5/1 m

Gebindegröße

5 l

Tilmor verfügt über eine starke Wirkung gegen Krankheiten und regelt das Wachstum. Tilmor bringt Ihren Raps sicher über den Winter.

- + Am stärksten gegen Phoma u.w.
- + Bremst das Blattflächen- und fördert das Wurzelwachstum
- + Mehr Ertrag und mehr Rentabilität durch Tilmor
- + Erhöht die Winterfestigkeit



Folicur®

Der Hit seit über 30 Jahren.

Nichts ist besser als das Original.

Fungizid

Beste Formulierung und Verträglichkeit.

Pfl.Reg.Nr. 2670-0

Wirkstoff

Tebuconazol 250 g/l

Aufwandmenge

1 l/ha (Winterfestigkeit) –
1,5 l/ha (Phomabekämpfung)

Anwendungszeitraum

Im Herbst ab dem 4- bis 8-Blattstadium (~ 80 % Bodendeckung) des Bestandes.

Gewässerabstand

Getreide: 10/5/1/1 m Grünstreifen auf abtragsgefährdeten Flächen.

Gebindegrößen

5 l, 15 l

Neben dem Wirkstoff ist auch die Formulierung entscheidend für die optimale Wirkung und Kulturverträglichkeit. Bayer steht für Qualität.

- + Breiteste Zulassung in über 66 Indikationen
- + Langjährig praxisbewährt
- + Bestens verträglich in Tankmischung mit Insektiziden und Blattdüngern



Unser Team



Hans Schwanzer

Tel.: 0664/160 67 66
hans.schwanzer@bayer.com
agr.ar.bayer.at/HansSchwanzer



Ing. Andreas Thomaso

Tel.: 0664/337 78 39
andreas.thomaso@bayer.com
agr.ar.bayer.at/AndreasThomaso



Ing. Helmut Heidlmayer

Tel.: 0664/262 84 96
helmut.heidlmayer@bayer.com
agr.ar.bayer.at/HelmutHeidlmayer




Benjamin Fleck

Tel.: 0664/881 34 129
benjamin.fleck@bayer.com
agr.ar.bayer.at/BenjaminFleck



DI Dominik Schober, BSc

Tel.: 0664/224 63 70
dominik.schober@bayer.com
agr.ar.bayer.at/DominikSchober



Quelle: MCSoft, www.mcsoft.at

® = e.Wz. der Bayer Gruppe bzw. des jeweiligen Herstellers. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wussten Sie, dass...

- + die massive Verungrasung von Ackerflächen mit Raygras und die Herbizidresistenz dazu führen, dass Ackerflächen **gehäckselt werden bzw. brach liegen müssen?**

Da die 3 Wirkstoffe des Mateno Trio Sets nicht resistenzgefährdet sind, leistet die Anwendung des Mateno Trio Sets im Herbst einen hervorragenden Beitrag zum vorbeugenden Resistenzmanagement.


- + jeder Fachberater über eine eigene Beraterseite verfügt, die Ihnen gezielte, gebietsspezifische Beratung, Videos und Veranstaltungstermine bietet?



**Einfach
informieren.**

- + auf www.agrar.bayer.at laufend Fachbeiträge und Versuchsergebnisse in unserem „**Agrar Magazin**“ sowie spannende Videos aus der Praxis in unserem „**Agrar TV**“ zu Ihrer Verfügung stehen?

- + wir zweimal wöchentlich den kostenlosen Newsletter-Service „**Wetter Aktuell**“ mit gebietsspezifischen Prognose-Tipps und Empfehlungen sowie einer standortgenauen 3-Tage Wettervorhersage anbieten?



**Einfach
informieren.**

Stand: Juli 2026. Irrtümer, sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
Bayer Austria Ges.m.b.H., Am Europlatz 1, 1120 Wien;
Druck: HH Print Management Deutschland GmbH,
Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf, Deutschland
Express® SX: FMC Agro, Pfl.Reg.Nr. 2914-0; Saracen®:
Nufarm GmbH & Co. KG, Pfl. Reg. Nr. 3562-0; Lentipur® 500:
Nufarm GmbH & Co. KG, Pfl.Reg.Nr. 3668-0



Beratungsdienst:
01/711 46-2835
crops.cience.austria@bayer.com
www.agrar.bayer.at